

7.5. 48

пр. 6 от 26/х1-93г.
и. 5
4Б.

П А С П О Р Т

1. Класс - технический
2. Тянь-Шань, западный Кокшаал-Тау
3. Пик Подмосковный по Северному гребню
4. Предлагается 5"Б" к.тр., первовосхождение
5. Перепад 1133 м. Протяженность 1250 м.
Протяженность участков 5-6 к.тр. 730 м, из них 6 к.тр. -
120м. Средняя крутизна основной части маршрута 65°.
6. Забито крючьев:

скальных	шлямбурных	закладок	ледовых
32/3	0/0	51/8	12/0
7. Ходовых часов команды: 24 и дней 3.
8. Ночевки: 1- на перемычке под маршрутом, 2 - на вершине ^{летя-}ка-
не
9. Метеоусловия: сложные
10. Капитан: Ахматов Ф.А., КМС
Участники: Викулин С.И., КМС
Шамонов И.С., I р.
Романов В.А., I р.
- II. Подход под маршрут, ночевка на перемычке - 10.08.93г.
Выход на маршрут - 11.08.93г.
Вершина - 11.08.93г.
Возвращение - 12.08.93г.



Профиль стены справа.
Снято 10.08.91г. в 10⁰⁰ (точка
съемки №6) H=3900м; L=1км.

Погода весной и летом 1993 г. в Киргизии была особенно неблагоприятной: регулярные осадки, часто очень сильные, пониженная средняя температура. В результате заснеженность и особенно обледенение гор были выше среднего уровня.





Фото панорамы р-на
(Точка съемки №5) фото 1969 г. H=5000м L=5км



Техническое фото вершины.
Снято 9.08.93г. в 11⁰⁰ H=4500м; L=1,5км

Погода весной и летом 1993 г. в Киргизии была особенно неблагоприятной: регулярные осадки, часто очень сильные, пониженная средняя температура. В результате заснеженность и особенно обледенение гор были выше среднего уровня.



Ущелье Чон-турасу. М 1:100000.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЙОНА ВОСХОЖДЕНИЯ

Пик Подмосковский расположен в районе Западного Кокшал-Тау. Альпинистское освоение этого района началось с экспедиции Летавета (1932г.). В 1969 году в районе работала экспедиция подмосковных альпинистов, которой был пройден траверс пиков Кибальчича, Королева, Цандера (4-е место чемпионата СССР). В начале 70-х годов в районе пика Данкова побывала экспедиция казахских альпинистов общества "Енбек". В конце 80-х годов в наиболее доступной западной части хребта в районе пика Кзыл-Аскер работали казахские экспедиции под руководством Попенко, Валиева, Ильинского и Сидельникова (1989г.).

Для района Западного Кокшал-Тау характерны суровые климатические условия, частая непогода. Скалы двух типов: монолитные заглаженные черные бараньи лбы с малым количеством танких трещин или монолитные отколы с малым количеством зацепок, но с широкими трещинами. Характер скал, а также обилие натечного льда сильно усложняют организацию страховки и требуют применения всего арсенала скального снаряжения - разнообразного набора закладок, в том числе и очень крупных, скальных крючьев, включая лепестки, френдов.

Наиболее удобным вариантом заброски в район Западного Кокшал-Тау безусловно является заброска вертолетом через города Бишкек или Каракол (пржевальск). Имеется также два возможных варианта заброски на машине (мы использовали первый вариант).

1). г. Бишкек - Иссык-Куль - пос. Барскаун - перевалы Барскаун и Суек в долину реки Нарын до поселка Карасай, где расположена пограничная застава, затем через хребет Баркалдой в ущелье реки Узенге-Гуш и далее вверх до реки Чон-Турасу - притоку Узенге-Гуш. Весь путь от Бишкека до базового лагеря занимает 2 дня (500 км).

2). г. Бишкек - г. Нарын - район п. Кзыл-Аскер - верховья реки Узенге-Гуш.

Базовый лагерь был расположен в 7 км от устья реки Чон-Турасу.

Погода весной и летом 1993 г. в Киргизии была особенно неблагоприятной: регулярные осадки, часто очень сильные, пониженная средняя температура. В результате заснеженность и особенно обледенение гор были выше среднего уровня.

Подготовка к восхождению.

Для подготовки к участию в Чемпионате СНГ по альпинизму 1993г. тренерским советом ФАМО была разработана программа подготовки к Чемпионату, которая содержала программы технической, физической и психологической подготовки.

Первоначальное знакомство с пиком Подмосквитин был произведено по фотографиям, отснятым в 1969г. экспедицией альпинистов Подмосквитин.

По прибытии в район п. Подмосквитин была проведена тщательная разведка предполагаемого маршрута во время совершения восхождения на в. Зинаида и п. Чандера. Был изучен характер строения северного гребня, просмотрены варианты подъема и ухода с предполагаемого маршрута, а также возможные пути спуска с вершины. Непосредственно перед выходом на восхождение маршрут просматривался в течение суток в 20-кратную трубу.


В целях обеспечения безопасности планировалось вести визуальное наблюдение за командой группой из 2-3 человек, в число которых входил Бн врал сбора, у лагеря под склонами п. Королева.

Связь команды с группой наблюдателей предполагалось осуществлять с помощью малогабаритных УКВ радиостанций "Интермехника", связь наблюдателей с базовым лагерем - с помощью более мощных УКВ Р/станций "Русь".


Спортивная форма участников команды была к началу восхождения оптимальной. Этому способствовала хорошая акклиматизация, полученная во время совершения тренировочных восхождений

(в. Зипаунде, 5560, в. Вирошас, 4900). Тренировочные восхождения подготовили кроме того привыкнуть к особенностям данного района, характеру скального рельефа. Большую роль сыграли также регулярные тренировки во время подготовки к сезону, особенно совершение спортивных восхождений в Крыму в районе Ласпи (г. Куш-Кале).

График восхождения.



Маршрут в символах УИАА





Ночевка на перемычке под вершиной
Снято 10.08.93г. в 18³⁰ высота 4200м
Аппарат Cassio, F=35мм.



Выход на маршрут 11.08.93г.
Снято в 7³⁰, небольшой снег, туман.

Погода весной и летом 1993 г. в Киргизии была особенно неблагоприятной: регулярные осадки, часто очень сильные, пониженная средняя температура. В результате заснеженность и особенно обледенение гор были выше среднего уровня.



В. Романов проходит перила
на участке с 4-5
Снято 11.08.93г. в 10³⁰



В. Романов проходит перила
на участке 1-2
Снято 11.08.93г. в 9³⁰



Ф. Адматов На участке 9-10
Снято 11.08.93г. в 15³⁰
Туман, небольшой снег.

Погода весной и летом 1993 г. в Киргизии была особенно неблагоприятной: регулярные осадки, часто очень сильные, пониженная средняя температура. В результате заснеженность и особенно обледенение гор были выше среднего уровня.